

بررسی فراوانی نسبی دیابت حاملگی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه عرصه پزشکی جامعه نگر کرمانشاه

دکتر نسرین جلیلیان^۱، دکتر طراوت فاخری، دکتر میترا یاری، سارا دائی چین

مقدمه: دیابت شیرین حاملگی، دیابت زمان بلوغ یا تیپ ۲ است که در هنگام بارداری آشکار یا کشف می گردد، تشخیص به موقع دیابت حاملگی و ادامه آن در طول حاملگی یک سری عوارض از قبیل افزایش احتمال به HTN، پره اکلامپسی، UTI، سزارین و... برای مادر و و عوارضی چون ماکروزومی، نقایص لوله عصبی، هیپو گلیسمی نئوناتال، چاقی دوران کودکی و... برای نوزاد به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تاکنون مطالعه ای این چینی در این باره صورت نگرفته بر آن شدیم تا فراوانی نسبی دیابت حاملگی را به دست آوریم.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی و روش انجام آن تشخیص دیابت در بارداری به کمک تست های FBS و OGTT با gr۵۰ گلوکز خوراکی پس از ۱ ساعت بود.

یافته ها: از میان ۵۰۴ زن باردار مراجعه کننده تنها ۴ نفر دیابت حاملگی داشتند (۰/۷٪) همگی BMI > ۲۶ که از این ۴ نفر ۲ نفر گراوید ۱، یک نفر گراوید ۲ و یکی هم گراوید ۴ بود.

نتیجه گیری: نتیجه جالب بدست آمده از این مطالعه فراوانی ۰/۷٪ دیابت حاملگی بود که در مقایسه با آمار به دست آمده از سایر مطالعات شیوع نسبتاً پایین تری داشت.

واژه های کلیدی: دیابت شیرین، دیابت بارداری، شیوع، عوارض

^۱ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه