

یافته ها : ۸۷٪ مادران در ۶ ساعت اول، ۱۰/۵٪ مادران در ۶ ساعت دوم و ۲/۵٪ مادران ۱۲ ساعت بعد از سزارین شروع به شیردهی نمودند. شیردهی در مادران پریمی پار و سطح تحصیلات متوسط زودتر بود ، همچنین در مادران ۳۰-۲۰ سال و مادرانی که به طور Elective سزارین شده بودند شیردهی سریعتر شروع شده بود، در مواردی که در آنها بی حسی منطقه ای بکاررفته بود در مقابل بیهوشی عمومی این روند نیز زودتر بود. جنس نوزاد تأثیری بر روی زمان اقدام و شروع شیردهی نداشت. متوسط زمان اقدام به شیردهی ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه و متوسط زمان شروع به شیردهی ۴ ساعت و ۵۲ دقیقه بعد از سزارین بود.

نتیجه گیری : شیردهی به دنبال سزارین به موقع شروع می گردد و عوامل مؤثر در آن نوع بیهوشی، تعداد زایمان و میزان تحصیلات مادر می باشد.

واژه های کلیدی : شیردهی - زایمان سزارین - شیر مادر



بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان آرایشگر کرمانشاه نسبت به بیماری ایدز در سال ۱۳۸۷

بهزاد کرمی متین^۱، جمشید درایت^۲، کیومرث شرفی^۳، تارخ خدادادی^۴، الهام تقیان پیر دوستی^۴

مقدمه: بیماری ایدز در حال حاضر یک همه گیری جهانی محسوب می شود که آلودگی به آن در حال گسترش روز افزون است. اگرچه بعضی از کشورهای پیشرفته توانسته اند در مهار این نوع بیماری موفقیت هایی داشته باشند اما در کشورهای در حال توسعه، گسترش اپیدیمی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در حال حاضر بهترین راه پیشگیری از گسترش و کنترل آن، آموزش و اصلاح رفتار گروه های در معرض خطر می باشد. با عنایت به چگونگی شغل آرایشگری و خطر انتقال بیماریهای ویروسی همچون ایدز برآن شدیم تا آگاهی، نگرش، و عملکرد این گروه را در رابطه با بیماری ایدز بسنجدیم.

^۱ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

^۲ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

^۳ دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

^۴ دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه